

ANQ-Webportal – Interaktive Grafik

Informationen zur Messung der Funktionsfähigkeit bei Alltagsaktivitäten und zur Darstellung mittels SCIM

Paraplegiologische Rehabilitation

Der Spinal Cord Independence Measure (SCIM)-Score misst die Funktionsfähigkeit von Patientinnen und Patienten mit einer Querschnittslähmung/Rückenmarksverletzung. Das Assessment besteht aus 19 Items zu den Bereichen Selbstversorgung, Atmung, Kontinenz und Mobilität und wird anhand von Beobachtungen im Klinikalltag vom Klinikpersonal ausgefüllt. Pro Item können die Patientinnen und Patienten auf einer mehrstufigen Antwortskala 0 bis maximal 15 Punkte erreichen. Die Werte der einzelnen Items werden addiert und können zwischen 0 (minimale Funktionsfähigkeit) und 100 (beste Funktionsfähigkeit) resultieren.

Um die individuellen Fortschritte der Patientinnen und Patienten zu erheben, wird jede Messung sowohl bei Reha-Eintritt als auch bei Reha-Austritt durchgeführt.

Die im Nationalen Messplan Rehabilitation vorgeschriebenen Messungen dienen der Qualitätssicherung und -entwicklung auf Klinikebene und dem nationalen Vergleich. Die einzelnen Messergebnisse bilden nur Teilaspekte ab und lassen deshalb keine Rückschlüsse auf die Gesamtqualität einer Klinik zu.